



תיקון פטוזיס (צניחת עפעף)

מה זה פטוזיס?

פטוזיס הוא מצב של צניחת עפעף עליון. הוא יכול להיות מולד או נרכש (לרוב עקב היחלשות השריר המרים את העפעף). מעבר למראה האסתטי, פטוזיס עלול להפריע לשדה הראייה.

מה עושים בניתוח?

הניתוח נעשה לרוב בהרדמה מקומית. המנתח מחזק או מקצר את השריר האחראי להרמת העפעף, או מחבר את העפעף לשריר המצח במקרים מסוימים. חתך עדין מבוצע לרוב בקפל העפעף. התפרים מוסרים כשבוע לאחר הניתוח.

שאלות נפוצות

- **כמה זמן נמשך הניתוח? כשעה עד שעה וחצי.**
- **האם הניתוח כואב? לא בזמן הניתוח (הרדמה מקומית). לאחר מכן, כן, אי נוחות קלה.**
- **האם אצטרך עזרה לאחר הניתוח?** מומלץ מלווה לאחר הניתוח ועזרה בימים הראשונים.
- **האם יש צלקות? הצלקות נסתרות.**
- **כמה זמן מחזיקות התוצאות?** שנים רבות, ולעיתים קבועות.
- **האם התוצאה סימטרית לגמרי?** קשה להגיע לסימטריה מושלמת.

למה לצפות אחרי הניתוח?

- **נפיחות ושטפי דם:** צפויים וחולפים תוך שבוע-שבועיים. קומפרסים קרים עוזרים.
- **אי נוחות** מטופלת במשככי כאבים.
- **ראייה מטושטשת** זמנית עשויה להופיע.
- **חזרה לשגרה:** לפעילות קלה תוך ימים; לעבודה תוך כשבוע. פעילות מאומצת ואיפור רק לאחר שבועיים-שלושה.
- **תוצאות סופיות** נראות בהדרגה עם ירידת הנפיחות, ומתייצבות תוך שבועות/חודשים. הצלקות מוסתרות בקפל העפעף ומיטשטשות עם הזמן.

אתם בידיים טובות. הצוות הרפואי כאן כדי ללוות, להרגיע ולענות על כל שאלה

המרכז
הרפואי
שמיר



מחלקת עיניים שמיר
SHAMIR EYE INSTITUTE