



הסרת פטריגיום

מהו פטריגיום?

פטריגיום הוא צמיחת רקמה בשרנית משולשת מלחמית העין לכיוון הקרנית (החלק השקוף של העין). הפטריגיום קשור לרוב לחשיפה ממושכת לשמש, רוח ואבק. הוא עלול לגרום לגירוי, אדמומיות, צריבה, יובש, ובמקרים מתקדמים להפרעה בראייה עקב כיסוי ציר הראייה או שינוי מבנה הקרנית.

מה עושים בניתוח?

הניתוח נעשה בהרדמה מקומית, ובו מסירים את הפטריגיום מהקרנית והלחמית. בכדי למנוע חזרה של הפטריגיום, לרוב מבוצעת השתלת לחמית עצמית (רקמה קטנה הנלקחת מאזור אחר בריא בעין של המטופל/ת) ונתפרת או מודבקת למקום ממנו הוסרה הרקמה. לעיתים נעשה שימוש בטיפות כימותרפיות למנוע הישנות.

שאלות נפוצות

- כמה זמן נמשך הניתוח? בין 30-60 דקות.
- האם הפטריגיום יכול לחזור? בשיטות ניתוח מתקדמות, הסיכון לחזרה נמוך יחסית, אך קיים (כ-5-10%).
- האם נשארת צלקת? לרוב לא נשארת צלקת משמעותית.
- מתי חוזרים לשגרה? ניתן לחזור לפעילות קלה תוך מספר ימים, ולפעילות מלאה תוך 2-3 שבועות.

למה לצפות אחרי הניתוח?

- עין אדומה וכואבת: שכיח בימים הראשונים. מומלץ להשתמש בטיפות עיניים ומשככי כאבים לפי ההנחיות.
- תחושת "גוף זר": בשל התפרים או הדבק. התחושה חולפת בהדרגה.
- הגבלות: יש להימנע משפשוף, מאמץ ומגע מים במשך שבועיים.
- שיפור בתחושה ובמראה: שיפור מהיר בגירוי, ובמראה האסתטי. ייתכן גם שיפור קל בראייה אם הפטריגיום כיסה את ציר הראייה

אתם בידיים טובות. הצוות הרפואי כאן כדי ללוות, להרגיע ולענות על כל שאלה

המרכז
הרפואי
שמיר

