

הוראות הכנה לבדיקות ברפואה גרעינית

ממוין לפי קוד השירות

קוד השירות	תיאור השירות	הוראות הכנה
		לנשים : אם הנך בהיריון או קיים סיכוי להיריון נא להודיע על כך לפני הבדיקה והזרקת החומר הרדיואקטיבי.
78007	מיפוי בלוטת התריס, עם קליטה, מספר מדידות עם טכנציום	מסמכים דרושים : 1. הפניה 2. התחיבות 3. מיפויים וצילומים קודמים : CT, US, בדיקות מעבדה (TSH, T3, T4). משך הבדיקה כשעתיים וחצי. נבדקים המטופלים בתרופות לבלוטת התריס : יש להפסיק נטילת מרקפטיזול או פרופילתיאוציל (PTU) למשך 4 ימים טרם הבדיקה ולהפסיק טיפול באלתרוקסין חודש לפני הבדיקה בתאום עם הרופא המטפל. יש לוודא עם הנבדק אם ביצע בדיקת CT עם חומר ניגודי בשישה שבועות אחרונים.
78010	מיפוי בלוטת התריס	מסמכים דרושים : 1. הפניה 2. התחיבות 3. מיפויים וצילומים קודמים, CT, US, בדיקות מעבדה (TSH, T3, T4). משך הבדיקה כשעה וחצי. נבדקים המטופלים בתרופות לבלוטת התריס : יש להפסיק נטילת מרקפטיזול או פרופילתיאוציל (PTU) למשך 4 ימים טרם הבדיקה ולהפסיק טיפול באלתרוקסין חודש לפני הבדיקה בתאום עם הרופא המטפל. יש לוודא עם הנבדק אם ביצע בדיקת CT עם חומר ניגודי בשישה שבועות אחרונים.
78018	מיפוי בלוטת התריס לגרורות, כל גופי, I-131	הנחיות ניתנות ע"י רופא ואח אלי.

<p>78070</p> <p>מיפוי יותרת בלוטת התריס, פרתירואיד</p> <p>אין צורך בצום. אורך הבדיקה כ- 4 שעות. נא להביא : 1. הפניה 2. התחיבות 3. מסמכים, רפואיים, צילומים קודמים : CT, US. בדיקות מעבדה (Ca, PTH).</p>		78070
<p>L8074</p> <p>מיפוי בלוטת יותרת הכליה, אדרנל-מדולה, I-123-MIBG לילדים עד גיל 7</p> <p>בדיקה מתחת לגיל 7. טופס 17 ישלח מראש. אין צורך בצום. אורך הבדיקה כ 4 שעות. ביום הראשון מגיעים בשעה 08:00 מקבלים זריקה והצילומים יהיו בשעה 12:00. ביום למחרת החולה מגיע בשעה 07:00 לצילומים. נא להביא : 1. הפניה 2. התחיבות 3. מסמכים רפואיים רלוונטיים. הנחיות רפואיות על הפסקת תרופות יינתנו ע"י רופא המכון.</p>		L8074
<p>78195</p> <p>מיפוי בלוטות לימפה ודרכי לימפה</p> <p>אין צורך בצום. אורך הבדיקה כשעתיים. נא להביא : 1. הפניה 2. התחיבות 3. מסמכים רפואיים רלוונטיים.</p>		78195
<p>78205</p> <p>מיפוי כבד וטחול, SPECT</p> <p>אין צורך בצום. אורך הבדיקה כשעה. נא להביא : 1. הפניה 2. התחיבות 3. מסמכים רפואיים, מיפויים וצילומים קודמים, CT, US.</p>		78205
<p>78205</p> <p>מיפוי כבד כדוריות דם אדומות מסומנות</p> <p>אין צורך בצום. משך בדיקה כ- 3 שעות. נא להביא : 1. הפניה 2. התחיבות 3. מסמכים רפואיים, מיפויים וצילומים קודמים : CT, US. לוודא שהחולה לא ביצע CT עם חומר ניגודי בשישה שבועות אחרונים.</p>		78205
<p>78223</p> <p>מיפוי דרכי מרה וכיס מרה, ללאעם שימוש בתרופות, ללאעם מדידת תפקוד</p> <p>להגיע בצום של 6 שעות לפחות. משך הבדיקה כארבע שעות (בצום) יתכנו גם צילומים נוספים כעבור 24 שעות. חולי סכרת נא להתייעץ עם הרופא המטפל לגבי הצום. להביא : 1. הפניה 2. התחיבות 3. מסמכים רפואיים, מיפויים וצילומים קודמים : CT, US.</p>		78223

	כיס מרה	
78231	מיפוי בלוטות רוק, עם סדרת תמונות	אין צורך בצום. אורך הבדיקה כשעה. נא להביא: 1. הפניה 2. התחיבות 3. מסמכים רפואיים, 4. לימון שלם.
78258	מיפוי תנועתיות ושט, דינמי	להגיע בצום של 4 שעות לפחות. משך הבדיקה כשעה. חולי סכרת נא להתייעץ עם הרופא המטפל לגבי הצום. להביא: 1. הפניה 2. התחיבות 3. מסמכים רפואיים.
78262	מיפוי רפלקס קיבתי-ושטי	להגיע בצום של 4 שעות לפחות. משך הבדיקה כשעה. חולי סכרת נא להתייעץ עם הרופא המטפל לגבי הצום. להביא: 1. הפניה 2. התחיבות 3. מסמכים רפואיים 4. גביע אשל או לבן, לתינוקות: בקבוק הנקה, חלב ומזון לתינוקות.
78264	מיפוי התרוקנות קיבה	להגיע בצום של 4 שעות לפחות. משך הבדיקה כשעה. חולי סכרת נא להתייעץ עם הרופא המטפל לגבי הצום. להביא: 1. הפניה 2. התחיבות 3. מסמכים רפואיים 4. 30 גר ריבה, 3 ביצים טריות ו-2 פרוסות לחם. לתינוקות: בקבוק הנקה חלב ומזון לתינוקות. לסוכרתיים: ריבה ללא סוכר
78278	מיפוי דמם חריף במערכת העיכול, דינמי וסטטי	להגיע בצום של 4 שעות לפחות. משך הבדיקה כארבע שעות ולפי הצורך עד 24 שעות. חולי סכרת נא להתייעץ עם הרופא המטפל לגבי הצום. להביא: 1. הפניה 2. התחיבות 3. מסמכים רפואיים רלוונטיים.
78290	מיפוי רקמת מעיים, כגון רירית קיבה אקטופית, מקלס	בתיאום עם הרופא המטפל יש לקחת שלושה ימים לפני המיפוי ובבוקר הבדיקה טיפול תרופתי של RANITIDINE במינון המתאים לנבדק. נא להביא את התרופה עמך למכון ביום הבדיקה. להגיע בצום של 4 שעות לפחות. משך הבדיקה כשעתיים ולפי הצורך עד 24 שעות. חולי סכרת נא להתייעץ עם הרופא המטפל לגבי הצום. להביא: 1. הפניה 2. התחיבות 3. מסמכים רפואיים רלוונטיים.

<p>אין צורך בצום. אורך הבדיקה 4-5 שעות. לאחר הזרקת החומר לבדיקה יש להרבות בשתייה, 4-8 כוסות. נא להביא: 1. הפניה 2. התחיבות 3. מסמכים רפואיים, 3. מיפויים וצילומים קודמים CT, US.</p>	<p>מיפוי עצם וואו מפרק, כל גופי</p>	<p>78306</p>
<p>אין צורך בצום. אורך הבדיקה כ-4-5 שעות. לאחר הזרקת החומר לבדיקה יש להרבות בשתייה, 4-8 כוסות. נא להביא: 1. הפניה 2. התחיבות 3. מסמכים רפואיים, 3. מיפויים וצילומים קודמים, CT, US.</p>	<p>מיפוי עצם וואו מפרק, תלת שלבי</p>	<p>78315</p>
<p>אין צורך בצום. אורך הבדיקה כ-4-5 שעות. לאחר הזרקת החומר לבדיקה יש להרבות בשתייה, 4-8 כוסות. נא להביא: 1. הפניה 2. התחיבות 3. מסמכים רפואיים, 3. מיפויים וצילומים קודמים, CT, US.</p>	<p>מיפוי עצם וואו מפרק, SPECT</p>	<p>78320</p>
<p>אין צורך בצום. אורך הבדיקה כ-3 עד 4 שעות. לאחר הזרקת החומר לבדיקה יש להרבות בשתייה, 4-8 כוסות. נא להביא: 1. הפניה 2. התחיבות 3. מסמכים רפואיים, 3. מיפויים וצילומים קודמים, CT, US.</p>	<p>מיפוי עצם וואו מפרק, כל גופי, לאחר 24 שעות</p>	<p>78399</p>
<p>אין צורך בצום. אורך הבדיקה כשעה. נא להביא: 1. הפניה 2. התחיבות 3. מסמכים רפואיים רלוונטיים.</p>	<p>מיפוי לב לדלף, דינמי</p>	<p>78428</p>

<p>מסמכים דרושים:</p> <p>1. מכתב הפניה, תרשים אקג אחרון, מיפוי קודם ומסמכים רפואיים נוספים במידה וקיימים.</p> <p>2. התחייבות כספית לקרן מחקרים אסף הרופא, עבור מיפוי לב ספקט טליום במאמץ (חובה) - לא תתקבל כל התחייבות אחרת).</p> <p>הכנה לבדיקה:</p> <p>1. הנך מתבקש/ת להיות בצום 4 שעות לפני הבדיקה (שתיית מים מותרת!) חולי סכרת - צום שעתיים בלבד.</p> <p>2. אין לשתות משקאות המכילים קופאין (קפה, תה, שוקו, קולה) 24 שעות לפני הבדיקה.</p> <p>3. אסור לעשן ואסור לשתות משקאות אלכוהוליים ביום הבדיקה.</p> <p>4. יש להתייעץ עם הרופא המטפל לגבי הפסקת התרופות הבאות לפני הבדיקה:</p> <ul style="list-style-type: none"> • חוסמי ביטא -בלוקרים 48 שעות לפני הבדיקה:קונקור(קרדילוק), נורמיטון(נורמלול), מטפרס(נאובלוק), לביטולול, דימיטון, אטנולול, ביזופרולול <p>פרופרנולול(דרליון), לופרסור.</p> <ul style="list-style-type: none"> • חוסמי תעלות סידן-יש להפסיק 24 שעות לפני הבדיקה:איקאפרס, דילטם,וזודיפ,נורבסק וכו'. • ניטריטים-יש להפסיק 24 שעות לפני הבדיקה:מונוקרד(מנוניט), מונולונג,איזולונג <p>אין להפסיק תרופות אחרות. את התרופות שהופסקו יש להביא עמך לבדיקה.</p> <p>5. יש לבוא בביגוד מתאים ונוח לבדיקת המאמץ.</p> <p>6. נא להצטייד בארוחה קלה (סנדוויץ' + שתייה קלה), בחומר קריאה ובסבלנות.</p> <p>מהלך בדיקת מיפוי לב ספקט טליום במאמץ</p> <p>הבדיקה מתבצעת בשניים או שלושה שלבים ואורכת כ- 4 שעות:</p> <p>שלב א - מתבצע מבחן מאמץ על גבי סרט נע ובשיא המאמץ יוזרק לוריד טליום, או מיבי (במידה ואינך מסוגלת לבצע מאמץ יוזרק דיפירידמול המחקה מאמץ). לאחר המאמץ יבוצע צילום, משך הצילום כ - 20 דקות.</p> <p>שלב ב - לאחר הפסקה של עד 3 שעות יבוצע צלום נוסף במנוחה, לאחר הזרקה נוספת של טליום או מיבי.</p> <p>שלב ג - לעיתים תתבקש/י לבצע צלום נוסף למחרת בבוקר.</p> <p>בין שלב א' לשלב ב', בעת המנוחה, ניתן לאכול ארוחה קלה ולקבל טפול תרופתי, במידת הצורך.</p>	<p>מיפוי שריר הלב, פרפוזיה, במנוחה וואו מאמץ, SPECT</p>	<p>78465</p>
--	---	--------------

78472	מיפוי לב מאגר דס, BP, במנוחה/מאמץ עם EF, פלגרי	אין צורך בצום. אורך הבדיקה כשעה. נא להביא: 1. הפניה 2. התחיבות 3. מסמכים רפואיים רלוונטיים.
78585	מיפוי ריאות, פרפוזיה וונטילציה, קסנון	אין צורך בצום. אורך הבדיקה כשעתיים. נא להביא: 1. הפניה 2. התחיבות 3. מסמכים רפואיים רלוונטיים 4. צילום רנטגן של בית החזה שבוצע עד 3 ימים לפני תאריך המיפוי.
78596	מיפוי ריאות, פרפוזיה וונטילציה, כמותי	אין צורך בצום. אורך הבדיקה כשעתיים. נא להביא: 1. הפניה 2. התחיבות 3. מסמכים רפואיים רלוונטיים .
78607	מיפוי מוח, SPECT	אין צורך בצום. אורך הבדיקה כשעתיים. נא להביא: 1. הפניה 2. התחיבות 3. מסמכים רפואיים רלוונטיים 4. מיפויים וצילומים קודמים, CT, MRI, EEG.
78645	מיפוי CSF, הערכת מעבר בדלף, shunt	אין צורך בצום. אורך הבדיקה כשעתיים. נא להביא: 1. הפניה 2. התחיבות 3. מסמכים רפואיים רלוונטיים 4. מיפויים וצילומים קודמים, CT, MRI, EEG.
78707	מיפוי כליות דינמי ללא התערבות תרופתית	אין צורך בצום. לפני הבדיקה יש לשתות 6 כוסות ולהתרוקן לפני תחילת המיפוי. אורך הבדיקה כשעתיים . נא להביא: 1. הפניה 2. התחיבות 3. מסמכים רפואיים, מיפויים וצילומים קודמים, US.
78708	מיפוי כליות דינמי עם התערבות תרופתית	אין צורך בצום. לפני הבדיקה יש לשתות 6 כוסות ולהתרוקן לפני תחילת המיפוי. אורך הבדיקה כשעתיים עד ארבע שעות. נא להביא: 1. הפניה 2. התחיבות 3. מסמכים רפואיים, מיפויים וצילומים קודמים, US. ילדים עד גיל 10 יש לשלוח למיון ילדים עד השעה 07:45 להרכבת וונפלון. לתינוקות יש להביא בגדים וטיטולים להחלפה ואוכל ליום שלם.

<p>אין צורך בצום. אורך הבדיקה ארבע-חמש שעות. לפני הבדיקה יש לשתות 6 כוסות מים ולהתרוקן לפני תחילת המיפוי. יש להפסיק תרופות ללחץ דם עפ"י הרשימה המצ"ב בזימון. נא להביא: 1. הפניה 2. שתי התחייבויות 3. מסמכים רפואיים, מיפויים וצילומים קודמים, US.</p>	<p>מיפוי כליות עם/ובלי קפוטן</p>	<p>78707 78708</p>
<p>אין צורך בצום. לפני הבדיקה יש לשתות 6 כוסות ולהתרוקן לפני תחילת המיפוי. אורך הבדיקה כשעתיים עד ארבע שעות. נא להביא: 1. הפניה 2. התחיבות 3. מסמכים רפואיים, מיפויים וצילומים קודמים, US. ילדים עד גיל 10 יש לשלוח למיון ילדים עד השעה 07:45 להרכבת וונפלון.</p>	<p>מיפוי כליות, SPECT (DMSA)</p>	<p>78710</p>
<p>אין צורך בצום. לפני הבדיקה יש לשתות 6 כוסות ולהתרוקן לפני תחילת המיפוי. אורך הבדיקה כשעתיים עד ארבע שעות. נא להביא: 1. הפניה 2. התחיבות 3. מסמכים רפואיים, מיפויים וצילומים קודמים, US.</p>	<p>מיפוי כליות דינמי עם GFR</p>	<p>78715</p>
<p>אין צורך בצום. אורך הבדיקה כשעה. נא להביא: 1. הפניה 2. התחיבות 3. מסמכים רפואיים, מיפויים וצילומים קודמים, US.</p>	<p>מיפוי רפלקס לשופכן, ציסטוגרם</p>	<p>78740</p>
<p>אין צורך בצום. אורך הבדיקה כשעה. נא להביא: 1. הפניה 2. התחיבות 3. מסמכים רפואיים רלוונטיים 4. מיפויים וצילומים קודמים, US.</p>	<p>מיפוי אשכים, דינמי וסטטי</p>	<p>78761</p>
<p>אין צורך בצום. אורך הבדיקה כשלוש שעות. יתכנו גם צילומים כעבור 24, 48, 72, ו-96 שעות. נא להביא: 1. הפניה 2. התחיבות 3. מסמכים רפואיים רלוונטיים 4. מיפויים וצילומים קודמים, CT, MRI.</p>	<p>מיפוי לאיתור, תהליך דלקתי, SPECT</p>	<p>78807</p>
<p>יש להגיע בצום 6 שעות לפני הבדיקה. שתיית מים מותרת ורצויה בזמן זה. יש להפסיק קופאינים 24 שעות לפני הבדיקה. יש לבצע דיאטה דלת פחמימות יום לפני הבדיקה. מאכלים המותרים לאכילה: כל סוגי השר, עופות,, דגים, ביצים, חלב, גבינות קשות, ירקות כמו חסה, פלפלים, שעועית ירוקה, ברוקולי, כרובית, אספרגוס, פטריות, אפונה, עלים ירוקים ועוד. יש להימנע מסוכר ופחמימות לדוגמא: פירות, מיץ פירות, ג'לי, לחם, לחמניות, עוגות, אורז, חומס, פסטה, יוגורט, דגני בוקר, שיבולת שועל, ציפס, קרקרים, פופקורן, קינוחים, ממתקים, פיצה, תפוחי אדמה, תירס, בצל, גזר, עגבניות, שתיה קלה, קפה, אלכוהול לסוגיו, בירה, יין. חובה להביא: 1. תוצאת קריאטינין 2. בדיקות דימות קודמות במידה ולא בוצעו במרכזנו כגון: PET-CT, CT, MRI. 2. טופס 17.</p>	<p>מיפוי PET-FDG, גלוקוז מסומן</p>	<p>78813</p>

<p>חולים סכרתיים חייבים לדווח לפני קביעת התור. יש הוראות בנפרד. יש להביא תוצאת בדיקת קריאטינין. אורך הבדיקה כ-3-4 שעות. מים מותר לשתות. הפסקת קופאינים 24 שעות לפני הבדיקה. לא לעשות מאמץ גופני ולא להיחשף לקור. בשעה 06:00 בבוקר יש לאכול ארוחה קלה ולקחת טיפול לסוכר ואז להיכנס לצום של 4 שעות (מים מותרים) ולהגיע בשעה 10:00.</p>	<p>מיפוי PET: חולים סכרתיים</p>	78813
<p>4 שעות צום. 24 שעות לפני לא לשתות קופאין. יש להביא בדיקות דם לקריאטינין.</p>	PET מוח	A0129
<p>4 שעות צום. 24 שעות לפני לא לשתות קופאינים. יש להביא בדיקות דם לקריאטינין + בדיקת PSA.</p>	PSMA	778812410
<p>4 שעות צום. 24 שעות לפני לא לשתות קופאינים. משך הבדיקה: כשעתיים.. הבדיקה מתבצעת בשיטת PET-CT לאחר הזרקת סומטוסטטין מסומן ע"י גליום 68 – Ga 68 DOTA NOC. במהלך הבדיקה תצטרף/י לשתות חומר ניגוד על בסיס יוד לסימון המעיים. לעיתים יש צורך גם בהזרקת חומר ניגוד דרך הוריד. נא להצטייד באינפורמציה רלוונטית למתן חומר ניגוד הכוללת: רגישות יתר, אלרגיה, אסטמה, תפקודי כליות (רמת קריאטינין בדם). יש להביא בדיקות דם עדכניות כולל תפקודי כליות ובדיקת הורמונים וסממני סרטן. יש להביא בדיקות קודמות להשוואה כולל MRI, CT או PET-CT. בחולים המקבלים תכשירים מסוג אוקטרוטייד (OCTEROTIDE), ליידע את הצוות הרפואי בזמן הזמנה כדי לתכנן את הבדיקה לפי סוג התכשיר. בתרופות קצרי טווח מספיק יום אחד הפסקה ובתרופות ארוכי טווח מומלץ ביצוע הבדיקה לפני טיפול מתוכנן הבא.</p>	<p>מיפוי רצפטורים לסומטוסטטין DOTA68</p>	L8802
<p>בדיקה מעל גיל 7. טופס 17 ישלח מראש. 4 שעות צום. הפסקת קופאינים 24 שעות לפני הבדיקה. יש להביא תוצאת בדיקת קריאטינין</p>	<p>מיפוי בלוטת יותרת הכליה, אדרנל-מדולה, F-DOPA</p>	L8075

<p>להגיע בצום של 4 שעות, לאחר קבלת הטיפול יש להישאר בצום למשך שעתיים נוספות. מסמכים דרושים: 1. הפניה 2. התחיבות 3. מיפויים וצילומים קודמים, CT, US, בדיקות מעבדה (TSH, T4). משך הבדיקה כשעה/יש להפסיק נטילת מרקפטזול או PTU ארבעה ימים לפני וגם 4 ימים אחרי הבדיקה. יש לחדש את הטיפול בהוראתו של האנדוקרינולוג המטפל.</p>	<p>טפול רדיופרמקולוגי בפעילות יתר של בלוטת התריס</p>	<p>L9000</p>
<p>להגיע בצום של 4 שעות, לאחר קבלת הטיפול יש להישאר בצום למשך שעתיים נוספות. מסמכים דרושים: 1. הפניה 2. התחיבות 3. מיפויים וצילומים קודמים, CT, US, בדיקות מעבדה (TSH, Tg, Anti-Tg, T4). משך הבדיקה כשעה. יש להפסיק נטילת מרקפטזול או PTU ארבעה ימים לפני וגם ארבעה ימים אחרי הבדיקה.</p>	<p>מתן יוד רדיואקטיבי לאבלציה של בלוטת התריס</p>	<p>L9030</p>
<p>אין צורך בצום. משך בדיקה כשעה.</p>	<p>מיפוי דרכי דמעות</p>	<p>78660</p>

סרקואידוזיס: טופס 17 ל PET. 12 שעות צום. 24 שעות דיאטה דלת פחמימות ועשיר בשומן.

עלימוליאידוזיס: קוד ללב מוגה, ללא הכנות